



GDON du Libournais
BP 15 - 14 rue Guadet - 33330 Saint-Emilion
Email : animateur@gdon-libournais.fr
Tel : 06 82 43 69 81

Bulletin Technique 01

Le 26 mars 2026

Le GDON du Libournais est contributeur du BSV Aquitaine. Ce bulletin prend en compte le BSV [Hors-Série, Lancement de Campagne du 23-03](#)

Les estimations des niveaux de pression et de risques présentées dans ce bulletin sont établies sur la base de réseaux d'observation menés dans le cadre de protocoles standardisés. Ces données sont analysées par des techniciens spécialisés en épidémiologie-surveillance. Les résultats diffusés représentent une tendance générale de la situation au vignoble. Elle ne peut se substituer à une analyse des risques individuelle et nécessite d'être adaptée aux spécificités de chaque parcellaire.

Le suivi de notre réseau de pièges est réalisé en collaboration avec Vitivista et Phloème. Le suivi des maladies cryptogamiques et la modélisation des risques sont réalisés en collaboration avec l'IFV Blanquefort et Géosens. Les données météorologiques proviennent des réseaux Demeter 33 et Sencrop, elles sont gracieusement mises à disposition par des châteaux du secteur et le prestataire Aquitaine Viti Service.

L'ESSENTIEL EN QUELQUES MOTS

Phénologie	Stade moyen « éclatement du bourgeon »
Mildiou	Risque nul, à réévaluer en début de semaine prochaine
Eudémis	Mise en place du réseau de pièges

SYNTHESE METEOROLOGIQUE

SYNTHESE DE LA PERIODE HIVERNALE

Les mois d'octobre et novembre 2025 suivent un climat proche de la moyenne historique. La période hivernale devient atypique à partir du mois de décembre, plus chaud de 1°C et présentant un déficit pluviométrique de 50 % (45 mm contre 89 mm pour la moyenne historique). Les mois de janvier et février compensent largement ce déficit, avec des excès de respectivement 34 et 83 mm. Le mois de février est également bien plus chaud que la moyenne (+ 2,4°C). Les cumuls pluviométriques de la période octobre 2025 – février 2026 (493 mm) sont excédentaires de près de 100 mm par rapport à la moyenne (395 mm). Cette différence est atténuée par un mois de mars pour l'instant très sec (cumul de 22,2 mm au 24/03), sans pluies significatives annoncées d'ici le 1^{er} avril.

Le diagramme ombrothermique (tableau 1) présente la comparaison entre l'année en cours et les moyennes historiques.




Tableau 1 : Diagramme ombrothermique comparé 2025/2026 et 2006/2025

SYNTHESE METEO DE LA PERIODE du 19 au 25 mars 2026

	Températures			Pluviométrie (cumul)
	Minimales	Maximales	Moyennes	
Valeurs extrêmes sur le territoire (min/ max)	-1°C / 8,9°C	13,1 / 21,8°C	9,2 / 12,3°C	0 / 0,9 mm
Moyenne de la semaine	3,4°C	18,6°C	10,9°C	0,4 mm

Tableau 2 : Données météorologiques : du 19 au 25 mars, source Sencrop (40 stations) et Weenat (15 points)

La semaine écoulée est caractérisée par des T°C conformes aux normales de saison, avec des T°C moyennes de 10,9°C. Les T°C minimales ont peu varié, autour de 2°C entre le 20 et le 25 mars. Les stations les plus froides présentent des T°C proches de 0°C, voire parfois négatives sur cette période. Les maximales se sont maintenues entre 18 et 20°C jusqu'au 24 mars, avant une baisse marquée à 13°C le mercredi 25 mars. Aucune précipitation significative n'est relevée cette semaine, seules quelques bruines inférieures à 1 mm ont eu lieu le mercredi 25 mars.

Météo prévisionnelle (sources OADEx. Météociel. Météo Blue, Weenat) : du 26 mars au 1^{er} avril 2026

Des T°C matinales froides avec des risques de gel sont attendues vendredi 27 et dimanche 29 mars avant une remontée entre 6 et 10°C à partir de mardi 31 mars. Les maximales suivront la même tendance, avec des T°C comprises entre 11 et 14°C jusqu'au lundi 30, suivie d'une légère hausse à partir du mardi 31. Elles se maintiendront cependant sous les 20°C.

Des pluies sont attendues le samedi 28 mars avec des cumuls associés faibles, variant de 0,5 à 4 mm selon les modèles consultés. Certaines sources annoncent également des précipitations inférieures à 2 mm sur la journée du 30 mars.



Phénologie au vignoble

Les observations de phénologie ont été réalisées le lundi 23 mars 2026 sur 14 parcelles de Merlot et une parcelle de Cabernet Franc réparties sur le territoire. Une notation du pourcentage de bourgeons effectivement débourrés (stade pointe verte) est réalisée sur 20 ceps. Au 23 mars, 13 des 15 sites avaient dépassé le stade 50% des bourgeons débourrés.

Sous l'effet des T°C importantes de février et début mars, il s'agit du débourrement le plus précoce depuis le début des suivis (2012), avec quelques jours d'avance sur les millésimes 2020 et 2024. Les T°C plus basses de cette semaine devraient freiner le développement du vignoble.

La phénologie est hétérogène avec d'un côté des parcelles plus tardives encore au stade bourgeon dans le coton et des parcelles plus précoces où l'on observe déjà quelques feuilles étalées. Les pratiques culturales mises en œuvre cet hiver, notamment la date de taille ont nettement influé la dynamique de débourrement.



Observation des ravageurs

VOL D'EUDEMIS

La pose des pièges sexuels est en cours et devrait être finalisée vendredi 27 mars 2026 pour un premier relevé prévu autour du 1^{er} avril 2026. Nous invitons les partenaires du réseau à débuter leurs observations et à transmettre la carte de vos parcelles nouvellement confusées pour mettre à jour nos informations.

Le seuil de 570 degrés jours cumulés depuis le 1^{er} février est atteint sur la moitié des stations au 25 mars. En conséquence, les dispositifs de lutte par confusion sexuelle doivent être en place.



Maladies Cryptogamiques

DATE D'OBSERVATION DES TEMOINS NON TRAITES (TNT) : Le 23 mars 2026

Mildiou : risque nul en l'absence de pluie significative.

Excoriose : risque nul sous les conditions climatiques actuelles.

DETAIL DES RISQUES CRYPTOGRAMIQUES PAR THEMATIQUE

PERIODE : DU 26 mars au 01 avril 2026

MILDIOU

La vigne est-elle au stade de réceptivité ?	Actuellement le stade majoritairement atteint est « éclatement du bourgeon ». Le stade de réceptivité à la maladie de 2/3 feuilles étalées n'est pas encore atteint même sur le parcellaire le plus avancé.
Les œufs sont-ils matures ?	Cette année nous ne disposons plus du suivi de maturité des oospores par germination, réalisé auparavant par la FREDON Aquitaine. Les deux autres indicateurs suivis divergent : le modèle basé sur la somme thermique pendant l'hiver indique un début de maturité autour du 22 mars. Cette prévision n'est pas confirmée par le modèle Potentiel Système qui prévoit une maturité des œufs autour du 10 avril. La marge d'erreur concernant la date de maturité des œufs est donc importante (18 jours), mais les conditions climatiques prévues jusqu'au 02 avril restent défavorables à toute germination.
Contaminations prévues dans les prochains jours par les modèles	Les différents modèles n'enregistrent aucune contamination pour la semaine à venir, sous des pluies faibles. Même sous une hypothèse plus défavorable (15 mm le 28), le modèle ne détecte aucune contamination.
Conclusion	Le risque général est nul jusqu'au 02 avril. Le stade de réceptivité de la vigne n'est pas encore atteint et les conditions climatiques (T°C basses, pluies faibles) à venir sont pour l'instant défavorables au mildiou. Pour les parcelles les plus précoces qui vont bientôt atteindre le stade 2/3 feuilles étalées, le risque sera à réévaluer en cas de pluies plus importantes et de hausse annoncée des T°C.

EXCORIOSE

Atteinte du stade de réceptivité ?	Le stade de réceptivité à l'excoriose se situe entre le débourrement et le stade 2/3 feuilles étalées et peut se prolonger jusqu'au stade 6/8 feuilles étalées si grande sensibilité des parcelles. En cas de débourrement hétérogène, les stades phénologiques doivent être observés pour les bourgeons les plus proches de l'axe.
Fréquence des symptômes au vignoble ?	Les symptômes d'excoriose sont visibles à la base des rameaux sous la forme de plaques liégeuses, présentant un aspect déformé et strié, généralement associées à un étranglement du rameau ou sous la forme de blanchiment des bois de 1 an. La fréquence générale de ceps touchés dans les parcelles est très faible, 3 % en moyenne avec un maximum à 11 % et les symptômes observés sont très légers. Le seuil de nuisibilité associé à la maladie varie entre 10 et 30 % des bois touchés selon les sources consultées. Les Cabernets présentent une sensibilité accrue par rapport aux Merlots et peuvent être privilégiés pour l'évaluation des risques.
Conditions de contamination ?	Les contaminations excoriose nécessitent de réunir à la fois des pluies significatives prolongées suivies d'une longue période d'humectation et des T°C > 12°C.
Evaluation du niveau de risque	Les conditions météorologiques sont défavorables au développement de la maladie.
Conclusion	La protection contre l'excoriose doit être réfléchi au cas par cas sur les seules parcelles présentant des symptômes réguliers et ayant atteint le stade de sensibilité sur les bourgeons de la base des rameaux, uniquement sous des conditions météorologiques favorables. Le risque est nul cette semaine en l'absence de pluies prolongées.

Prochain bulletin : le 02 avril 2026

L'équipe du GDON du Libournais,