



GDON du Libournais
BP 15 - 14 rue Guadet - 33330 Saint-Emilion
Email : animateur@gdon-libournais.fr
Tel : 06 82 43 69 81

Bulletin Technique 17

Le 16 juillet 2026

Le GDON du Libournais est contributeur du BSV Aquitaine. Ce bulletin prend en compte le BSV [n°16 du 15-07-2026](#)

Les estimations des niveaux de pression et de risques présentées dans ce bulletin sont établies sur la base de réseaux d'observation menés dans le cadre de protocoles standardisés. Ces données sont analysées par des techniciens spécialisés en épidémiologie-surveillance. Les résultats diffusés représentent une tendance générale de la situation au vignoble. Elle ne peut se substituer à une analyse des risques individuelle et nécessite d'être adaptée aux spécificités de chaque parcellaire.

Le suivi de notre réseau de pièges est réalisé en collaboration avec Vitivista et Phloème. Le suivi des maladies cryptogamiques et la modélisation des risques sont réalisés en collaboration avec l'IFV Blanquefort et Géosens. Les données météorologiques proviennent des réseaux Demeter 33 et Sencrop, elles sont gracieusement mises à disposition par des châteaux du secteur et le prestataire Aquitaine Viti Service.

L'ESSENTIEL EN QUELQUES MOTS

Phénologie	Stade moyen « Début véraison »
Mildiou	Risque nul à faible sous prévisions météo incertaines
Oïdium	Fin de protection sur les parcelles indemnes
Black rot	Fin de protection sur les parcelles indemnes
Vers de grappes	Bilan de la pression G2 en pages 3-4, en attente du départ du 3 ^{ème} vol

SYNTHESE METEOROLOGIQUE

SYNTHESE METEO DE LA PERIODE du 09 au 15 juillet 2026

	Températures			Pluviométrie (cumul)
	Minimales	Maximales	Moyennes	
Valeurs extrêmes sur le territoire (min/ max)	14,7 / 23,3°C	31,8 / 40,2°C	26,5 / 28,8°C	4,6 / 51,4 mm
Moyenne de la semaine	20°C	36,3°C	28,3°C	22,6 mm

Tableau 1 : Données météorologiques : du 09 au 15 juillet, sources Sencrop (40 stations) et Weenat (15 points)

Les conditions caniculaires se sont maintenues toute la semaine. Les minimales ont peu varié, entre 17,5°C (le 10 juillet) et 22,8°C (le 15 juillet) en moyenne. Dans le même temps, les maximales sont restées supérieures à 35°C, à l'exception du lundi 13 juillet, journée la plus « fraîche », avec des maximales moyennes autour de 32°C. La T°C moyenne hebdomadaire est de 28,3°C, en hausse de 2,2°C par rapport à la semaine précédente.

Un épisode orageux de forte intensité s'est déroulé dans la soirée du 10 juillet, avec des cumuls de pluies variant fortement de 4,6 à 51,4 mm. Les précipitations les plus importantes sont situées au milieu du territoire, sur un axe Pomerol / Saint Emilion / Castillon la Bataille. Ces pluies ont pu être accompagnées de grêle, dont les impacts sont majoritairement visibles sur l'ouest de Saint Emilion et Pomerol (secteur Hippodrome / Figeac / Bigaroux). Les dégâts sont encore difficiles à évaluer et ne devraient pas excéder 5 à 10 % de pertes de récolte sur les parcelles les plus fortement impactées.




Figure 1 : Pluviométrie cumulée du 09 au 15 juillet 2026, sources Sencrop (40 stations) et Weenat (15 points)

Météo prévisionnelle (sources OADEx. Météociel. Météo Blue, Weenat) : du 16 au 22 juillet 2026

Après une dernière journée caniculaire ce jeudi 16 juillet (20 à 36°C), les T°C devraient rester estivales mais sans excès. Les minimales attendues se situent entre 17 et 20°C et les maximales entre 29 et 35°C jusqu'au mercredi 22 juillet. Deux des quatre modèles présentent des prévisions plus extrêmes, avec des T°C supérieures à 37°C annoncées pour les 20 et 21 juillet. Un nouvel épisode orageux pourrait avoir lieu cette nuit, de jeudi 16 à vendredi 17 juillet, avec des cumuls de 0,1 à 4,2 mm annoncés selon les modèles. Aucune pluie n'est ensuite prévue pour le reste de la semaine.



Phénologie au vignoble

La véraison a débuté sur l'ensemble du vignoble. Les suivis de phénologie sont réalisés sur une placette fixe de 20 ceps, la véraison est estimée par palpation sur 100 baies choisies aléatoirement. En date du 15 juillet, toutes nos parcelles ont atteint le stade « 1ères baies vérées ». La véraison moyenne est de 15 %, variant de 37 % à Saint Magne de Castillon à tout juste 1 % sur Lalande de Pomerol et Saint-Emilion (Cabernet Franc). Des dégâts de brulure sur feuilles et sur grappes liées aux fortes chaleurs sont observés. Ce stress hydrique freine par endroit la progression de la véraison.



Observation des ravageurs

VOL D'EUDEMIS

Suivi des vols :

Eudémis : Seul un piège sexuel situé dans le vignoble urbain de Libourne enregistre deux captures cette semaine. Il s'agit des prémices du 3^{ème} vol, détectés sur une parcelle historiquement précoce. Le départ de vol devra être confirmé la semaine prochaine.

Suivi des perforations :

La fin du vol marque la période optimale pour observer la pression de G2 sur le parcellaire. Un bilan de perforations a été réalisé sur 71 parcelles des réseaux suivis par le GDON du Libournais (pièges + TNT). Les observations sont réalisées sur 50 grappes choisies aléatoirement par site.

La pression moyenne est de 4 %, proche des valeurs de 2021 (2 %) et 2022 (6 %), parmi les plus faibles historiquement.




Figure 2 : historique des perforations de G2, 2008-2026

De fortes hétérogénéités entre parcelles sont constatées, 23 sites ne présentent aucune perforation alors que 9 parcelles dépassent le seuil de 10 % de grappes touchées, considéré comme le seuil de décision pour une intervention en 3^e génération. Elles sont situées sur les communes des Artigues de Lussac, Lalande de Pomerol, Libourne (x2), Lussac (x2), Montagne (x2) et Tayac.

	0 grappe perforée	< 10 grappes perforées	10 à 25 grappes perforées	> 25 grappes perforées
Nb de parcelles	23 (32 %)	39 (55 %)	9 (13 %)	0 (0 %)
Moyenne de perforations (en %)	0	8,2	28,2	0

Tableau 2 : bilan 2026 des perforations de G2

Pour les parcelles concernées par les pressions importantes, il est trop tard pour intervenir sur cette génération, les traitements phytosanitaires devront cibler les pontes de la G3. Leur présence devra être confirmée par observation des parcelles.



Flavescence Dorée

Suivi des efficacités des traitements larvaires

Les pièges jaunes utilisés pour la surveillance des populations adultes de cicadelles de la flavescence dorée sont désormais posés et seront relevés à fréquence hebdomadaire entre le 13 juillet et le 05 août 2026 dans les 31 zones soumises à traitements obligatoires en 2026.

La décision de renouvellement de traitement dans les zones concernées sera donc connue le 05 août 2026, sur la base des relevés effectués.

Certains pièges jaunes sont volontairement placés dans des parcelles sans obligation de traitement, afin de connaître l'évolution des niveaux de population de l'insecte dans des zones non traitées depuis de nombreuses années. Dans ce dernier cas, les résultats de piégeage ne peuvent pas entraîner de demande de mise en place en traitement et servent d'indicateur dans notre plan de gestion pluriannuel.



Maladies Cryptogamiques

DATE D'OBSERVATION DES TEMOINS NON TRAITES (TNT) : Le 15 juillet 2026

Mildiou : Risque nul à faible sous prévisions météo incertaines

Black rot et Oïdium : Fin de protection sur les parcelles indemnes de symptômes

DETAIL DES RISQUES CRYPTOGRAMIQUES PAR THEMATIQUE

Période du 16 au 22 juillet 2026

MILDIOU

Déroulement de l'épidémie 2026	1 ^{ère} contaminations le 11 avril puis généralisation des symptômes foliaires suite aux pluies du 29 avril – 07 mai. Les différents épisodes pluvieux suivant se sont montrés peu contaminants.
Contaminations déjà détectées par les modèles	Pluies du 10 juillet : Des contaminations sont détectées par les modèles suite aux orages du 10 juillet, sous des conditions de pluviométrie importante (> 20 mm). L'expression des symptômes devrait apparaître autour du 17 juillet.
Contaminations prévues par les modèles	Période du 16 au 17 juillet : les modèles ne prévoient pas de nouvelles contaminations sous les faibles pluies annoncées. Seul le modèle Vitimétéo enregistre un risque de repiquage en cas de pluies > à 2 mm. Potentiel Systeme ne réagit qu'à partir d'une pluviométrie plus importante (>15 mm), scénario non prévu mais probable sous les conditions orageuses actuelles.
Symptômes détectés au vignoble	Dans les Témoins non traités : l'évolution de la maladie est une nouvelle fois très limitée cette semaine. Seule une parcelle située à Montagne, présente une légère augmentation des symptômes, passant de 22 à 25 % d'attaque sur feuilles et de 41 à 49 % sur grappes. Dans le vignoble traité : l'état sanitaire est très bon sur la quasi-totalité du parcellaire traité.
Conclusion	La période à suivre est considérée comme défavorable, le début de la véraison marque la fin de la période de sensibilité des grappes au mildiou. Seul un risque de contamination secondaire (repiquage) est identifié sous les pluies prévues le 16-17 juillet. Une protection intégrale contre la maladie est conseillée pour les parcelles qui présentent des pressions sur grappes significatives et uniquement jusqu'à ce que le stade mi- véraison soit complètement atteint. En cas de pluies plus importantes, la protection contre le mildiou sert désormais à assurer un bon état sanitaire du feuillage à l'approche des vendanges. Les travaux de rognage, écimage constituent les meilleures méthodes prophylactiques pour limiter la progression du mildiou. Le maintien de la protection phytosanitaire doit systématiquement être réalisée en amont des pluies annoncées.

BLACK-ROT / OIDIUM

Le début de la véraison marque la fin de sensibilité des baies à ces maladies, sous réserve qu'elles ne soient pas déjà implantées de façon régulière sur grappes.

La protection phytosanitaire peut être stoppée dans toutes les situations à l'exception des parcelles montrant une présence régulière et significative de ces maladies sur grappes.

En cas de symptômes réguliers, poursuivre une protection phytosanitaire adaptée jusqu'à la mi- véraison.

Prochain bulletin : le 23 juillet 2026

L'équipe du GDON du Libournais,